FAXE KOMMUNE

Center for Social, Sundhed & Pleje

Titel:	**Instruks:** **Sikkerheds- og forholdsregler ved håndtering af medicin.**
Gældende for:	Center for Social, Sundhed & Pleje, Faxe Kommune.
Ansvarlig:	Lederne i Center for Social, Sundhed og Pleje.
Målgruppe:	Medarbejdere der er ansvarlige for håndtering af medicin i Faxe Kommune.
Formål:	Formålet er at beskytte personalet mod skade som følge af håndtering af medicin.

Begreber:	• **Tabletter:** en tablet er en afvejet dosis lægemiddel, der er blevet presset og beregnet til at sluge og skylle ned med vand. • **Salver og cremer:** Salver bruges normalt til udvortes brug. Alle navne på salver henviser til, hvor de skal bruges, for eksempel øjensalve, mundsalve, rektalsalve osv. Cremer er beregnet til at bruge på hud eller slimhinder. De er ikke fedtede som salver er. • **Pulver:** Er fast lægemiddel, der består af små partikler af næsten ens størrelse. Pulveret kan være opdelt i portionsposer eller breve, der indeholder en bestemt mængde lægemiddel, typisk én dosis i hver pose. Pulveret kan også være i større beholdere, hvorfra der skal doseres med måleske. • **Granulater** er en kontrolleret sammenklumpning af pulver. • **Injektionsvæsker:** Er en betegnelse for væsker, der indeholder lægemidler, som er beregnet til injektion. Injektionsvæsker bruges til at sprøjte ind i kroppen, dette kan gøres subcutant eller intramuskulært. • **Hætteglas med tørstof:** Glas med tørstof til opløsning med væske til injektion. • **Ampul:** Glas med væske til injektion. • **Risikoaffald:** Er affald der ikke kan bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, for eksempel medicinrester, sprøjter og kanyler. • **IV-medicinering:** flydende medicin som sprøjtes direkte ind i en blodåre. (Det er kun sygepl. der må give intravenøst).

Beskrivelse af opgaven:	**Ved dosering af tabletter:** Der bruges handsker ved fremtagning, deling eller knusning af tabletter. Ved knusning af tabletter kan, når det er nødvendigt, anvendes en lukket morter. **Salver og cremer:** Påføres med engangshandsker eller ved brug af spartel. Husk anbrudsdato. **Pulver:** Ophældning af pulver skal foregå, så det støver mindst muligt for at nedsætte risiko for indånding og hudkontakt. **Injektionsvæsker:** Ved præparering anvendes arbejdsmetoder, der begrænser udvikling og spredning af damp og aerosoler mest muligt. **Hætteglas med tørstof:** Ved opløsning af tørstof og efterfølgende udtagning af den ønskede lægemiddelmængde anvendes følgende procedure: Den afmålte opløsningsvæske tilsættes ved at trække lidt luft op i sprøjten, hvorefter undertrykket i hætteglasset udlignes ved langsomt at lade lidt væske løbe ned langs hætteglassets side. Proceduren gentages, til al væsken er tilsat tørstoffet. Til sidst trækkes yderligere luft op i sprøjten, således at der er et lille undertryk i hætteglasset. Følgende procedure gør at trykforskellen ikke afstedkommer at medicin sprøjter ud af sprøjten.

	Ampul: Ved optrækning af lægemiddel fra ampul, er det vigtigt at være opmærksom på følgende således, at spild på hud undgås. • Fjern væsken fra ampulhalsen ved let banken. • Hold beskyttelse omkring ampulhalsen og knæk ampulhalsen. Brug altid handsker ved omgang med medicin. Vær opmærksom på, at ved restmedicin i hætteglas eller ampuller, der skal anvendes til en senere dosering, skal anbrudsdato og klokkeslæt altid fremgå. **Ved uheld:** Ved uheld med spild af lægemiddelopløsning tørres strakt op med køkkenrulle og afvaskes med vand og sæbe. Spildt medicin på huden eller hudkontakt afvaskes straks med vand og sæbe. Ved stænk i øjet skylles med vand eller saltvand i mindst 15 minutter. Ved vedvarende gene kontaktes læge. Arbejdsgiver og arbejdsmiljørepræsentant kontaktes med henblik på skadesanmeldelse. Affald der er forurenet med medicin skal bortskaffes, som risikoaffald (se særskilt instruks).		
Dato:	Godkendt marts 2022	**Revideres:**	Marts 2024
Udarbejdet af:	Ulla Johansen, Anita Petersen og Henriette Jensen.		